

ПРИЛОЖЕНИЕ III
ЕТИКЕТ И ЛИСТОВКА

А. ЕТИКЕТ

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

{Кутя}

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Форесто 1,25 g + 0,56 g, противопаразитна каишка за котки и кучета ≤ 8 kg
Imidacloprid
Flumethrin

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ

Една каишка съдържа:
1,25 g imidacloprid, 0,56 g flumethrin.

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Противопаразитна каишка, сива, без мирис.

4. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

1 x 38 cm каишка
2 x 38 cm каишки

5. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Котки, кучета (≤ 8 kg).

6. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Убива кърлежи и бълхи и отблъсква кърлежи (предотвратява ухапване) при кучета и котки.
Убива въшки при кучета. Индиректна защита срещу предаването на патогени, причинители на векторни заболявания (напр. лайшманиоза, ерлихиоза, бабезиоза) при кучетата. 7 - 8 месеца защита. Водоустойчива.

7. МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Прилагане върху кожата.
Преди употреба прочети листовката.

8. КАРЕНТЕН СРОК

9. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Преди употреба прочети листовката.

Съхранявайте опакованата каишка в кутията до момента на употреба.

10. СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година}

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

12. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Преди употреба прочети листовката.

13. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО

Само за ветеринарномедицинска употреба. Без лекарско предписание.

14. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

15. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Bayer Animal Health GmbH
51368 Leverkusen, Germany

16. НОМЕР НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП

0022-1622

17. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида {номер}

Пиктограми:



Кърлеж



Бълха



Ларва



Въшка

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

{Картонена кутия, съдържаща 12 каишки}

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Форесто 1,25 g + 0,56 g, противопаразитна каишка за котки и кучета ≤ 8 kg
Imidacloprid
Flumethrin

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ

Една каишка съдържа:
1,25 g imidacloprid, 0,56 g flumethrin.

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Противопаразитна каишка, сива, без мирис.

4. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

12 x 38 cm каишки

5. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Котки, кучета (≤ 8 kg).

6. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Убива кърлежи и бълхи и отблъсква кърлежи (предотвратява ухапване) при кучета и котки.
Убива въшки при кучета. Индиректна защита срещу предаването на патогени, причинители на векторни заболявания (напр. лайшманиоза, ерлихиоза, бабезиоза) при кучетата. 7 - 8 месеца защита. Водостойчива.

7. МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Прилагане върху кожата.
Преди употреба прочети листовката.

8. КАРЕНТЕН СРОК

9. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Преди употреба прочети листовката.

Съхранявайте опакованата каишка в кутията до момента на употреба.

10. СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година}

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

12. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Преди употреба прочети листовката.

13. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО

Само за ветеринарномедицинска употреба. Без лекарско предписание.

14. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

15. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Bayer Animal Health GmbH
51368 Leverkusen, Germany

16. НОМЕР НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП

0022-1622

17. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида {номер}

Пиктограми:



Кърлеж



Бълха



Ларва



Въшка

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА

{РЕТР/РЕ опаковка}

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Форесто 1,25 g + 0,56 g, противопаразитна кашка за котки и кучета ≤ 8 kg

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ

1,25 g imidacloprid, 0,56 g flumethrin в една кашка

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Противопаразитна кашка *[като част от наименованието]*

4. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

1 x 38 cm

5. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Котки, кучета *[като част от наименованието]*.

6. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

[пиктограми на бълхи, ларви, кърлежи и въшки]

7. МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Прилагане върху кожата.

8. КАРЕНТЕН СРОК

9. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

10. СРОК НА ГОДНОСТ

EXP

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

12. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

13. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО

Само за ветеринарномедицинска употреба.

14. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

15. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА



16. НОМЕР НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП

0022-1622

17. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot

Пиктограми:



В. ЛИСТОВКА

ЛИСТОВКА:

Форесто 1,25 g + 0,56 g, противопаразитна каишка за котки и кучета ≤ 8 kg

1. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба:

Bayer Animal Health GmbH
51368 Leverkusen
Germany

Производител, отговорен за освобождаване на партидата:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324, 24106 Kiel
Germany

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Форесто 1,25 g + 0,56 g, противопаразитна каишка за котки и кучета ≤ 8 kg
Imidacloprid
Flumethrin

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Една сива каишка, без мирис, с дължина 38 cm (12,5 g) съдържа 1,25 g imidacloprid и 0,56 g flumethrin като активни субстанции.

4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Котки:

За лечение и профилактика на опаразитяване с бълхи (*Ctenocephalides felis*) в продължение на 7 до 8 месеца.

Потиска развитието на ларвите на бълхите в средата, обитавана от животните в продължение на 10 седмици.

Foresto може да бъде използван като част от терапевтичната стратегия за контрол на алергичен дерматит, причинен от бълхи (FAD).

Каишката има постоянно акарицидно (убива) действие (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus turanicus*) и репелентно (предотвратява ухапване) действие срещу опаразитяване с кърлежи (*Ixodes ricinus*) в продължение на 8 месеца. Ефективна е срещу ларви, нимфи и възрастни кърлежи.

Кърлежите, прикрепени върху котката преди началото на лечението, може да не бъдат убити до 48 часа след поставянето на каишката и да останат прикрепени и видими. Поради това е препоръчително да бъдат отстранени преди поставянето. Предпазването от ново опаразитяване с кърлежи започва в рамките на два дни след поставянето на каишката.

Кучета:

За лечение и профилактика на опаразитяване с бълхи (*Ctenocephalides felis*, *C. canis*) в продължение на 7 до 8 месеца.

Потиска развитието на ларвите на бълхите в средата, обитавана от животните в продължение на 8 месеца.

Foresto може да бъде използван като част от терапевтичната стратегия за контрол на алергичен дерматит, причинен от бълхи (FAD).

Каишката има постоянно акарицидно (убива) действие срещу опаразитяване с кърлежи (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor reticulatus*) и репелентно (предотвратява ухапване) действие срещу опаразитяване с кърлежи (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) в продължение на 8 месеца. Ефективна е срещу ларви, нимфи и възрастни кърлежи.

Кърлежите, прикрепени върху кучето преди началото на лечението, може да не бъдат убити до 48 часа след поставянето на каишката и да останат прикрепени и видими. Поради това е препоръчително да бъдат отстранени преди поставянето. Предпазването от ново опаразитяване с кърлежи започва в рамките на два дни след поставянето на каишката.

За лечениена опаразитяване с въшки (*Trichodectes canis*).

Продуктът осигурява индиректна защита срещу предаването на патогените *Babesia canis vogeli* и *Ehrlichia canis* от кърлежа-вектор *Rhipicephalus sanguineus*, чрез което намалява риска от бабезиоза и ерлихиоза при кучетата в продължение на 7 месеца.

Намаляване на риска от инфекция с *Leishmania infantum* чрез предаване от пясъчни мухи за период до 8 месеца.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва при котенца под 10-седмична възраст и при кученца под 7-седмична възраст. Да не се използва при свръхчувствителност към активните субстанции или към някой от ексципиентите.

6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

В редки случаи се наблюдават поведенчески разстройства, които могат да включват криене, вокализация, хиперактивност, прекомерно облизване и/или почистване или чесане на мястото на приложение, при животни непривикнали да носят каишки, през първите няколко дни след поставянето. Агресия след поставяне на каишката е съобщавана в много редки случаи. Уверете се, че каишката е поставена правилно.

На мястото на приложение могат да се появят реакции, като сърбеж, зачервяване и оредяване на козината. Тези реакции са били съобщавани рядко при кучета и нечесто при котки и обикновено преминават в рамките на 1 до 2 седмици. В единични случаи може да бъде препоръчано временно отстраняване на каишката, до изчезване на симптомите.

В много редки случаи при кучета и рядко при котки, в мястото на приложение могат да се появят реакции като дерматит, възпаление, екзема, лезии или кръвоизлив. В тези случаи е препоръчително каишката да бъде свалена.

При кучета в редки случаи могат да се появят неврологични реакции като атаксия, конвулсии и тремор. При такива случаи е препоръчително каишката да бъде свалена.

В редки случаи при кучета и котки в началото могат да се проявят леки, преходни реакции, като потиснатост, промяна в приема на храна, слюноотделяне, повръщане и диария. Както и при други локални приложения, може да се прояви алергичен контактен дерматит при хиперсензитивни животни.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

- много чести (повече от 1 на 10 третирани животни, проявяващи неблагоприятни реакции по време на курса на едно лечение)
- чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 третирани животни)
- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1 000 третирани животни)
- редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10 000 третирани животни)
- много редки (по-малко от 1 животно на 10 000 третирани животни, включително изолирани съобщения).

Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинския продукт не работи, моля да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Котки, кучета (≤ 8 kg).

8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ


Котки и малки кучета с тегло до 8 kg – една каишка с дължина 38 cm.

Кучета с тегло над 8 kg – една каишка за кучета > 8 kg с дължина 70 cm.

Прилагане върху кожата. Една каишка се поставя около врата на едно животно. Само за външна употреба.

9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Извадете каишката от предпазната опаковка непосредствено преди употреба. Развийте каишката и се уверете, че няма остатъци от пластмасовите конектори от вътрешната ѝ страна. Поставете каишката около врата на животното, без да я стягате прекомерно (трябва да е възможно да поставите два пръста между врата на животното и каишката, както е показано). Изтеглете остатъка от каишката през халката и отрежете излишната част на 2 cm от халката.



Каишката трябва да се носи през целия 8-месечен период на защита и трябва да бъде свалена след изтичането му. Проверявайте периодично и при необходимост коригирайте каишката, особено при бързо растящи котенца/кученца.

Каишката е проектирана с механизъм за безопасност. При попадане в капан (малко вероятно при котки и изключително малко вероятно при кучета), собствената сила на животните обикновено е достатъчна да разширят каишката и бързо да се освободят

10. КАРЕНТЕН СРОК

Не е приложимо.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Този ветеринарномедицински продукт не изисква никакви специални условия за съхранение. Да не се използва след изтичане срока на годност, посочен върху вътрешната опаковка и кутията. Срокът на годност отговаря на последния ден от този месец.

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:

Кърлежите ще бъдат убити и ще паднат в рамките на 24 – 48 часа след опаразитяването, без да са смукали кръв. Прикрепянето на единични кърлежи след поставяне на каишката не е напълно изключено. Поради това, предаването на заразни заболявания от кърлежи не може да бъде напълно изключено при неблагоприятни условия.

В идеалния случай, каишката трябва да бъде поставена преди началото на сезонната поява на бълхите или кърлежите.

Въпреки доказаното значително намаляване на случаите с *Leishmania infantum* при кучета, продуктът е показал променлива репелентна (против ухапване) и инсектицидна ефикасност срещу пясъчната муха *Phlebotomus perniciosus*. Поради което, е възможно да има ухапвания от пясъчни мухи и предаването на *Leishmania infantum* не може да бъде напълно изключено. Каишката трябва да бъде приложена непосредствено преди началото на активния период на пясъчните мухи-вектори, съответстващ на сезона на предаване на *Leishmania infantum* и да се носи непрекъснато през рисковия период.

Както при всички локални продукти с продължително действие, сезонната смяна на козина може да доведе до леко, преходно намаляване на ефикасността, чрез загуба на свързани с козината активни субстанции. Каишката поглъща загубите незабавно и възстановява пълната ефикасност без допълнително лечение или замяна на каишката.

За оптимален контрол на бълхите в силно опаразитени жилища може да бъде необходимо третиране и на заобикалящата среда с подходящ инсектицид.

Продуктът е водоустойчив; запазва ефикасността си, ако животното се намокри. Независимо от това, продължително интензивно мокрене или обилно къпане с шампоан трябва да бъдат избягвани, тъй като продължителността на действие може да бъде намалена. Проучванията показват, че месечното къпане с шампоан или потапяне във вода след преразпределението на активните субстанции върху кожата не намаляват значително 8-месечната ефикасност срещу кърлежи, а ефикасността срещу бълхи постепенно намалява след 5-я месец. Влиянието на къпане с шампоан или потапяне във вода върху предаването на лайшманиоза при кучетата не е било изследвано.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:

Съхранявайте опакованата каишка във външната опаковка до момента на употреба.

Както с всеки друг ветеринарномедицински продукт, да не се позволява на малки деца да си играят с каишката или да я поставят в устата си. Да не се допуска животни с поставени каишки да спят в общо легло със стопаните, особено с деца. Imidacloprid и flumethrin се освобождават непрекъснато от каишката към кожата и козината, докато се носи.

Продуктът може да предизвика реакции на свръхчувствителност при някои хора.

Хора с установена свръхчувствителност (алергия) към активните субстанции и ексципиентите трябва да избягват контакт с ветеринарномедицинския продукт.

Продуктът може да причини дразнене на кожата, очите и дихателната система при някои хора в много редки случаи. При дразнене на очите, изплакнете внимателно очите със студена вода. При дразнене на кожата, измийте кожата със сапун и студена вода. Ако симптомите продължават, да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката или етикета на продукта.

Да се изхвърлят незабавно всякакви остатъци или изрезки от каишката (виж т. „Съвет за правилно приложение“).

След поставяне на каишката, измивайте ръцете със студена вода.

Бременност и лактация:

Лабораторните проучвания с flumethrin и/или imidacloprid при плъхове и зайци не показват никакво влияние върху плодовитостта или репродуктивността и никакви доказателства за

тератогенност или фетотоксичност. Независимо от това, безопасността на ветеринарномедицинския продукт не е доказана при видовете животни, за които е предназначен по време на бременност и лактация и поради липса на налични данни, не се препоръчва прилагането му по време на бременност и лактация.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

Поради естеството на каишката, предозирането е невъзможно и не се очакват признаци на предозиране.

При предозиране с 5 каишки, поставени на възрастни кучета и котки в продължение на 8 месеца и при 10-седмични котенца и 7-седмични кученца за 6 месеца, не са наблюдавани други неблагоприятни реакции, освен описаните в т. “Неблагоприятни реакции”.

В малко вероятния случай, в който животните изяждат каишката, може да се наблюдават леки гастроинтестинални симптоми (напр. неоформени изпражнения).

13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него трябва да бъдат унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство.

Продуктът не трябва да бъде изхвърлян във водни басейни, тъй като това може да бъде опасно за риби или други водни организми.

14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

01/2020

15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Опаковка: кутия, съдържаща една или две каишки; картонена опаковка, съдържаща 12 каишки. Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

Двете активни субстанции се освобождават бавно и постоянно в ниски концентрации от полимерната матрична система на каишката към животните. Двете активни субстанции присъстват върху кожата и козината в акарицидни/инсектицидни концентрации през целия период на ефикасност. Активните субстанции се разпространяват от мястото на контакт върху цялата кожна повърхност. Предозирането при видовете животни, за които предназначен и серумните кинетични проучвания доказват, че imidacloprid достига системна циркулация временно, а при flumethrin не е установена. Пероралната резорбция на двете активни субстанции няма значение за клиничната ефикасност.

Ефикасността срещу бълхи (*Ctenocephalides felis* и *Ctenocephalides canis*) започва в рамките на 48 часа след поставянето на каишката. В допълнение към показанията, посочени по-горе, е доказана ефикасност срещу бълхите *Pulex irritans*.

В допълнение към видовете кърлежи, посочени по-горе, при котки е доказана ефикасност срещу *Ixodes hexagonus* и кърлежи, които не се срещат в Европа - *Amblyomma americanum*, както и при кучета срещу *I. hexagonus*, *I. scapularis* и кърлежи, които не се срещат в Европа - *Dermacentor variabilis* и Австралийския паралитичен кърлеж *I. holocyclus*.

Продуктът осигурява репелентна (предотвратява ухапване) защита срещу описаните кърлежи, чрез което индиректно намалява риска от заразяване с векторни заболявания.

При котки е доказана индиректна защита срещу предаването на *Cytauxzoon felis* (пренасян от кърлежите *Amblyomma americanum*) в едно лабораторно проучване при малък брой животни, един месец след лечението, чрез което е намален рискът от заболявания, причинени от този патоген при условията на това проучване.

При кучета, в допълнение към патогените, посочени в терапевтичните показания, е доказана индиректна защита срещу предаването на *Babesia canis canis* (от кърлежите *Dermacentor reticulatus*) в едно лабораторно проучване, на 28^{-я} ден след лечението, и индиректна защита срещу предаването на *Anaplasma phagocytophilum* (от кърлежите *Ixodes ricinus*), в едно лабораторно проучване, 2 месеца след лечението, чрез което е намален рискът от заболявания, причинени от тези патогени при условията на проучванията.

Данните от проучванията на ефикасността срещу пясъчни мухи (*Phlebotomus perniciosus*) показват променлива репелентна (против ухапване) ефикасност, варираща от 65 до 89% за период от 7 – 8 месеца от първоначалното поставяне на каишката. Данните от 3 клинични полеви проучвания, проведени в ендемични за *Leishmania infantum* области, показват значително намаляване на риска от предаване на *Leishmania infantum* чрез пясъчни мухи при третираните кучета, в сравнение с нетретираните. В зависимост от инфекциозния натиск от пясъчните мухи, ефикасността при намаляване на риска от инфекция с лайшманиоза варира от 88,3 до 100%.

Каишките могат да подобрят състоянието на кучета, предварително опаразитени със *Sarcoptes scabiei* и напълно да излекуват саркоптозата след три месеца.

За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба.

Република България

Възраждане-Касис ООД

бул. България 102-4

BG Ловеч 5500

Тел: + 359 68 604 111